

**LANZAMIENTO IVERMECTINA**

Ivermectina 12 mg		Cantidad a elaborar: 2 ud		
Producto:		Cantidad	Total	Nº de lote
FASE I	Ivermectina	12 mg		
	Riboflavina*	csp		
	Capsucel	csp		
FASE II	Cápsulas nº4	2 ud		
ENVASE	Tarro pildorero	1 ud		

MODUS OPERANDI	
Orden	Procedimiento:
1	Preparar y pesar o medir los ingredientes necesarios.
2	En un mortero pulverizar muy finamente la ivermectina y añadirle la cantidad necesaria de colorante de contraste y homogeneizar.
3	Añadir geométricamente el capsucel y homogeneizar.
4	Preparar las cápsulas en el capsulador y proceder al envasado del polvo.
5	Cerrar las cápsulas
6	Envasar y etiquetar
<b>Elementos de seguridad personal:</b> Guantes, mascarilla, bata	
<b>Utillaje utilizado:</b> Balanza, espátula, mortero, varilla de vidrio, probeta, capsulador del número adecuado.	
CONTROL DE CALIDAD:	
Características organolépticas y verificación de peso.	RESULTADOS
Características del producto acabado: Cápsulas limpias exentas de polvo en su cara externa y de peso uniforme.	
PERSONAL ELABORADOR:	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE

<b>INFORMACION ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO</b>	
<p><b>INDICACIONES Y POSOLOGIA</b> La ivermectina es un fármaco usado para la sarna. Se administrará una cápsula y se repetirá la dosis a los 10 días.</p> <p><b>NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN</b> Tomar en ayunas.</p> <p><b>CONSERVACIÓN</b> Conservar a temperatura ambiente, en lugar fresco, seco, protegido de la luz y alejado de los focos de calor y humedad. La caducidad será de 90 días.</p> <p><b>REACCIONES ADVERSAS</b> Las reacciones adversas suelen ser picor, prurito, mialgia, astenia, entre otros y son en general leves y transitorias y responden bien a analgésicos y antihistamínicos. Puede causar irritación ocular.</p> <p><b>PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES</b> No utilizar en caso de alergia a alguno de los componentes de la fórmula. Uso contraindicado en caso de insuficiencia renal o hepática. Embarazo: Uso contraindicado. Lactancia: Uso contraindicado. Niños: El pediatra evaluará el uso en función de la edad y del peso. Neonatos: Uso contraindicado.</p> <p>Consulte a al farmacéutico si está utilizando algún otro medicamento, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b> *La riboflavina se añade a concentraciones que oscilan entre 0.25-0.5% sobre el volumen final de polvo.</p> <p><b>BIBLIOGRAFIA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Monografías del COF de Alicante, 1993.</li><li>2. "Martindale. The Extra Pharmacopoeia". 37th Edition. Ed. The Pharmaceutical Press. London. (2011). Monografía Farmacopea Europea.</li><li>3. <a href="https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum/ivermectina">https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum/ivermectina</a></li></ol>	