

Modus operandi Agua de Alibour

| Agua de Alibour | | Cantidad a elaborar: 100 mL | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|-------|------------|
| | Producto: | Cantidad | Total | Nº de lote |
| FASE I | Sulfato de cobre pentahidratado | 0,1% | | |
| | Sulfato de zinc | 0,4% | | |
| | Agua purificada | csp | | |
| FASE II | Alcanfor | 0.1% | | |
| | Alcohol 96º | 1% | | |
| Material acondicionamiento | Frasco vidrio topacio o de plástico topacio cuentagotas | 1 ud | | |

| MODUS OPERANDI | |
|---|--|
| Orden | Procedimiento: |
| 1 | Pesar/medir la cantidad necesaria de los productos a usar. |
| 2 | En un vaso de precipitados disolver el sulfato de cobre pentahidratado y el sulfato de zinc en el 90% del agua purificada. |
| 3 | En otro vaso de precipitados disolver el alcanfor en el alcohol con ayuda de una varilla. |
| 4 | Añadir el alcohol alcanforado sobre la solución acuosa y homogeneizar. |
| 5 | Medir el volumen en una probeta, completar con el resto de agua purificada y homogeneizar. Dejar reposar 24 horas. |
| 6 | Filtrar y envasar. |
| Elementos de seguridad personal: Guantes, mascarilla, bata, gorro. | |
| Utillaje utilizado: Balanza, Espátula de metal, agitador, imán teflonado, varillas. | |
| | |
| CONTROL DE CALIDAD: La RFE describe los controles de calidad como: Características organolépticas, volumen final. Características del producto acabado: Líquido transparente de color azul celeste y libre de partículas en suspensión, con olor a alcanfor. | RESULTADOS |

| | |
|--|-------------------------------|
| Aspecto final: Líquido transparente de color azul celeste y libre de partículas en suspensión, con olor a alcanfor. | |
| PERSONAL ELABORADOR: | FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE |
| INFORMACION ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO | |
| <p>INDICACIONES Y POSOLOGIA USO TÓPICO. NO INGERIR.</p> <p>La fórmula tiene acción astringente y antiséptica. Está indicada en el tratamiento del impétigo, dermatitis, eczemas, lesiones de piel sobreinfectadas y dermatosis exudativas. Aplicar el preparado 3-4 veces al día. Humedecer una gasa o una torunda de algodón con el preparado y aplicar sobre la zona a tratar, limpia y seca, según frecuencia indicada por el prescriptor (generalmente 3-4 veces al día)</p> <p>CONSERVACIÓN En condiciones óptimas, el plazo de validez es de 21 días en envase bien cerrado, protegido de la luz y a temperatura inferior a 25°C.</p> <p>REACCIONES ADVERSAS Uso contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los componentes, así como en enfermedad de Wilson o degeneración hepatolenticular.</p> <p>PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES No aplicar sobre ojos, heridas abiertas, mucosas, o zonas que presenten descamación epitelial. En caso de contacto accidental, lavar con abundante agua. Puede causar irritación local o reacciones de hipersensibilidad. En caso de ingestión accidental puede originar alteraciones gastrointestinales graves.</p> <p>OBSERVACIONES En algunas bibliografías también se incluye la tintura de azafrán al 0.2% en la formulación.</p> <p>BIBLIOGRAFIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Información del fabricante 2. Monografías COF de Alicante. | |