

STICK DESPIGMENTANTE (5 g)				
FASE	PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL (G)	Nº LOTE
FASE I	Fluocinolona acetónido	0.01%		
	Vitamina C	0.5%		
	BHT	0.03%		
	Hidroquinona	4%		
	Tretinoína	0.025%		
FASE II	Lanolina anhidra	10%		
	Aceite de coco	10%		
	Masa esteárica B	csp		
Envase	Envase roll on/Envase Stick labial	1 ud		
Utilaje: Mortero, espátula de metal, espátula de goma, baño de agua, varilla de vidrio				

MODUS OPERANDI	
Orden	Procedimiento:
1	Pesar y preparar cada uno de los productos que se vaya a necesitar.
2	En un mortero pulverizar muy finamente y en el siguiente orden la fluocinolona, el BHT, el retinoico, la vitamina C y la hidroquinona.
3	En un baño de agua, poner a fundir en un vaso de precipitados el aceite de coco, la lanolina y la masa esteárica a unos 55-60°C y mezclar con ayuda de una varilla.
4	Sacar la fase anterior del baño de agua e incorporar los productos previamente pulverizados del mortero, homogeneizando con ayuda de una varilla.
5	Añadir la mezcla aún en líquido al envase para que le haga de molde.
6	Envasar y etiquetar.

<p>CONTROL DE CALIDAD: La RFE describe los controles de calidad como: Características organolépticas, comprobación de peso.</p> <p>Características del producto acabado: Pasta sólida de color amarillento.</p> <p>Aspecto final: Pasta sólida de color amarillento.</p>	<p>RESULTADOS</p>
<p>PERSONAL ELABORADOR:</p>	<p>FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE</p>
<p>INFORMACION ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO</p>	
<p>INDICACIONES Y POSOLOGIA Este producto está indicado para el tratamiento de los melasmas moderados o severos del rostro. Se recomienda usar protección solar durante el tratamiento y evitar medicamentos que sean fotosensibles como los tratamientos hormonales, por ejemplo.</p> <p>NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: Aplicar 1 vez al día por la noche, 30 minutos antes de acostarse. Lavar y secar muy bien la zona a tratar. Aplicar una delgada capa de producto sobre las áreas hiperpigmentadas, con un masaje suave. No usar vendaje oclusivo.</p> <p>CONSERVACIÓN En condiciones óptimas, el plazo de validez es de 30 días. Guardar en envase bien cerrado, protegido de la luz, a temperatura inferior a 25°C y alejado de los focos de ignición.</p> <p>REACCIONES ADVERSAS Precaución en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los componentes. De entre los efectos secundarios frecuentes, pueden darse problemas como eritema, descamación, ardor, sequedad y prurito en el sitio de aplicación.</p> <p>PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES No aplicar sobre heridas, mucosas y lesiones de la piel que lleven consigo descamación epitelial. No usar en niños, ni en mujeres embarazadas o que se hallen dando lactancia.</p> <p>OBSERVACIONES *Como emulsión O/W se puede elaborar una crema base lanette, una base beelero una base con Neo PCL autoemulsionable O/W.</p> <p>BIBLIOGRAFIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Información del fabricante. 2. Monografías del COF de Alicante. 3. Compounding Today. 	