

Dapsona 5% gel			Cantidad a elaborar: 100 mL	
Producto:		Cantidad	Total	Nº de lote
FASE I	Dapsona	5%		
FASE II	Propilenglicol	5%		
FASE III	Gel hidroxietilcelulosa	csp		
ENVASE	Frasco SAMIX, tubo de aluminio	1 ud		

### MODUS OPERANDI

Orden	Procedimiento:
1	Preparar y pesar o medir los ingredientes necesarios.
2	En un mortero, pulverizar la Dapsona muy finamente.
3	Humectar la Dapsona con el propilenglicol.
4	Añadir el gel sobre la mezcla anterior y homogeneizar.
5	Envasar y etiquetar.

**Elementos de seguridad personal:** Guantes, mascarilla, bata

**Utillaje utilizado:** Balanza, espátula, varilla de vidrio, mortero, agitador mecánico tipo SAMIX.

CONTROL DE CALIDAD:	RESULTADOS
Características organolépticas y verificación de peso. Características del producto acabado: Gel semifluido de color blanco.	

PERSONAL ELABORADOR:	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE
----------------------	-------------------------------

## INFORMACION ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO

### INDICACIONES Y POSOLOGIA

Gel usado para el tratamiento del acné, por su efecto antibiótico y antiinflamatorio.

### NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Aplicar con cuidado una vez al día, tras lavar y secar la zona afectada. Lavar muy bien las manos después de la aplicación.

### CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco, protegido de la luz y con el envase bien cerrado.

### REACCIONES ADVERSAS

La presentación de reacciones adversas se suele manifestar con enrojecimiento o ardor de la piel, sequedad, picor, entre otros.

Comentar con el prescriptor en caso de que aparezca cualquier efecto secundario.

### PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES

No utilizar en caso de alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

No usar combinado con peróxido de benzoilo (puede causar que el color de la piel o del cabello se vuelva amarillo o anaranjado).

Embarazo: Uso contraindicado.

Lactancia: Uso contraindicado.

Niños: No usar en menores de 12 años.

Consulte a al farmacéutico si está utilizando algún otro medicamento, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.

### OBSERVACIONES:

La orina puede cambiar de color durante el tratamiento.

### BIBLIOGRAFIA:

1. "Martindale. The Extra Pharmacopoeia". 37th Edition. Ed. The Pharmaceutical Press. London. (2011).  
Monografía Farmacopea Europea.
2. <https://lazar.com.ar/pdf/pacientes/28-dapsogel.pdf>