



GABAPENTINA

| Gabapentina 50 mg/g, gel PLO | | Cantidad a elaborar: 42 mL | | |
|------------------------------|---|----------------------------|-------|------------|
| Producto: | | Cantidad | Total | Nº de lote |
| FASE I | Gabapentina | 5% | | |
| | Gel PLO GUINAMA | csp | | |
| ENVASE | SAMIX UNO DOSE AIRLESS DOSIFICACIÓN PRECISA TUBO ALUMINIO CON JERINGA DOSIFICADORA | 1 ud | | |

| MODUS OPERANDI | |
|---|--|
| Orden | Procedimiento: |
| 1 | Preparar y pesar o medir los ingredientes necesarios. |
| 2 | En un mortero pulverizar muy finamente la gabapentina. |
| 3 | En un envase samix introducir la gabapentina. |
| 4 | Añadir parte del gel PLO (un 10%) para humectarla y agitar a bajas revoluciones durante unos 30 segundos. |
| 5 | Añadir el resto del gel PLO y agitar a revoluciones medias durante un par de minutos o hasta homogeneidad del preparado. |
| 6 | Envasar y etiquetar |
| Elementos de seguridad personal: Guantes, mascarilla, bata | |
| Utillaje utilizado: Balanza, Espátula, mortero, SAMIX. | |
| CONTROL DE CALIDAD: | |
| Características organolépticas y verificación de contenido. | RESULTADOS |
| Características del producto acabado: Gel de color marrón claro. | |
| Aspecto final: Gel de color marrón claro. | |
| PERSONAL ELABORADOR: | FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE |

| | |
|---|--|
| | |
| INFORMACION ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO | |
| <p>INDICACIONES Y POSOLOGIA Este preparado está indicado para el tratamiento del dolor neuropático.</p> <p>NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Aplicar sobre la piel limpia y seca según prescripción facultativa.</p> <p>CONSERVACIÓN En condiciones óptimas, el plazo de validez es de 30 días. Guardar en envase bien cerrado, protegido de la luz, y a temperatura inferior a 25°C.</p> <p>REACCIONES ADVERSAS Puede generar irritación en la zona de aplicación.</p> <p>PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES No utilizar en caso de alergia a alguno de los componentes de la fórmula. No ingerir. Uso contraindicado en caso de insuficiencia renal o hepática. Embarazo: Uso contraindicado. Lactancia: Uso contraindicado.</p> <p>Consulte a al farmacéutico si está utilizando algún otro medicamento en la zona de aplicación, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.</p> <p>OBSERVACIONES: Las concentraciones de gabapentina pueden variar, pero el modus operandi sería el mismo. Si se desea realizar esta formulación para el tratamiento de la vulvodinia, el excipiente que se debería de usar sería la HRT GUINAMA.</p> <p>BIBLIOGRAFIA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Monografías del COF de Alicante, 1993.2. Compounding Today, Fórmula 3555. | |