

PASTA ORAL DE PIRANTEL, PRAZICUANTEL, FENBENDAZOL

PASTA ORAL DE PIRANTEL 50 MG, PRAZICUANTEL 50 MG, FENBENDAZOL 150 MG			Cantidad a elaborar: mL (4 uds 5 mL)	20
	Producto:	Cantidad	Total	Nº de lote
FASE I	Pirantel*	50 mg/ud		
	Prazicuantel	50 mg/ud		
	Fenbendazol	150 mg/ud		
	Glicerina	30%		
	Excipiente csp (60%)**			
FASE II	Polietilenglicol 4000	50%		
	Polietilenglicol 400	50%		
FASE III	Esencia de pollo	0,1%		
Envase	Jeringas 2,5 mL	4 ud		

MODUS OPERANDI	
Orden	Procedimiento:
1	Pesar y preparar cuidadosamente las cantidades necesarias de cada uno de los activos.
2	En un vaso de precipitados, fundir el PEG 4000.
3	Añadir el PEG 400 sobre el PEG 4000 y templar.
4	En un mortero pulverizar muy finamente los activos pulverulentos.
5	Añadir la glicerina poco a poco y sin dejar de agitar formando una pasta.
6	Añadir la mezcla de polietilenglicoles sobre el mortero, agitando hasta que se forme una pasta espesa. Homogeneizar.
7	Añadir la esencia y homogeneizar.
8	Envasar en jeringas de 2.5 mL y proteger de la luz.
Elementos de seguridad personal: Guantes, mascarilla, bata, gorro.	
Utillaje utilizado: Balanza, Espátula, mortero, varilla, vaso de precipitados, baño de agua, SAMIX, varilla SAMIX, probeta.	
CONTROL DE CALIDAD: Características organolépticas y verificación de peso.	
Características del producto acabado: Pasta de color amarillento y olor	
RESULTADOS	

característico.

Aspecto final:

PERSONAL ELABORADOR:

FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE

INFORMACION ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO

INDICACIONES Y POSOLOGIA

Tratamiento de infestaciones mixtas por nematodos y cestodos.

Especie de destino: perros.

Usar directamente. Dosis única. No aumentar la dosis prescrita.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

No enjuagar la boca, comer o beber hasta pasado mínimo 30 minutos.

No es necesario ayuno antes o después del tratamiento.

CONSERVACIÓN

En condiciones óptimas, el plazo de validez es de 180 días en la nevera.

Guardar en envase bien cerrado, protegido de la luz, en lugar seco.

REACCIONES ADVERSAS

En raras ocasiones se han observado trastornos gastrointestinales.

PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES

No utilice este medicamento si tiene alergia a cualquier componente de la formulación.

Lavar las manos después de la administración.

Consulte a su médico y farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.

NOTAS:

*1 g de pirantel equivale a 2,9g de pirantel embonato

** La cantidad de excipiente a preparar se deberá de revisar en función de la cantidad de unidades a preparar, ya que el volumen del polvo puede variar. Se recomienda realizar un 10% más de la cantidad prescrita para la formulación.

En caso de añadir una cantidad diferente de activos, se deberán de revisar las cantidades de cada uno de los productos a incorporar.

BIBLIOGRAFIA:

1. Bibl. Colegio Farmacéuticos de Vizcaya 5ª ed. 2004
2. Monografías del COF de Alicante, 1993..
3. "Martindale. The Extra Pharmacopoeia". 37th Edition. Ed. The Pharmaceutical Press. London. (2011).
4. Compounding Today.